Integral de línea II

5.1 Introducción

En esta sesión se revisa el Teorema Fundamental de integrales de línea y el análisis de las condiciones para que la integral de línea de un campo vectorial sea independiente de la curva de integración.

Actividad 5.1. Para el campo vectorial $F(x, y) = (xy, y^2)$, evaluar la integral de línea $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, para cada uno de los caminos que unen los puntos $A = (0, 0)$ y $B = (1, 1)$:

- 1) $C_1 : x = t, y = t, t \in [0, 1]$
- 2) $C_2 : x = t, y = t^2, t \in [0, 1]$

Respuesta: a) $2/3$ b) $9/20$

Actividad 5.2. Para el campo vectorial $F(x, y) = (2xy, x^2)$, evaluar la integral de línea $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, para cada uno de los caminos que unen los puntos $A = (0, 0)$ y $B = (1, 1)$:

- 1) $C_1 : x = t, y = t, t \in [0, 1]$
- 2) $C_2 : x = t, y = t^2, t \in [0, 1]$
- 3) $C_3 = C_{31} + C_{32}$, donde
 $C_{31} : x = t, y = 0, t \in [0, 1]$ y $C_{32} : x = 1, y = t, t \in [0, 1]$

Respuesta: a) 1 b) 1 c) 1

Nota 5.1. Las actividades precedentes sugieren que algunas integrales de línea dependen del camino que une dos puntos (actividad 1) y otras no (actividad 2).

5.2 Teorema fundamental para integrales de línea

Sea C una curva suave, contenida en un disco abierto D de $\mathbb{R}^2$ (o una esfera abierta de $\mathbb{R}^3$), que va desde el punto A hasta el punto B . Si $\vec{F}$ es un campo vectorial *conservativo* continuo sobre D y φ una función diferenciable, potencial para $\vec{F}$ ($\nabla\varphi = \vec{F}$), entonces

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

es independiente de la trayectoria C , y

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \varphi(B) - \varphi(A)$$

Corolario: Sea C una curva *cerrada* y suave contenido en disco abierto D de $\mathbb{R}^2$ (o una esfera abierta de $\mathbb{R}^3$). Si $\vec{F}$ es un campo vectorial conservativo continuo sobre B , entonces

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

Nota 5.2. Cuando la integral de línea es sobre una curva cerrada C , ésta se acostumbra a denotarla como

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Nota 5.3. El siguiente teorema establece una condición bastante simple para decidir si un campo vectorial es o no conservativo, y luego del teorema precedente si su integral de línea es no independiente de la trayectoria.

5.3 Teorema. Criterio de las componentes para un campo conservativo

Sea $\vec{F} = P\hat{i} + Q\hat{j}$ un campo vectorial sobre un disco abierto de $\mathbb{R}^2$, con P y Q funciones C^1 en este disco, entonces

$$\vec{F} \text{ es conservativo} \iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Nota 5.4. En caso que $\vec{F} = P\hat{i} + Q\hat{j} + R\hat{k}$ un campo vectorial sobre una esfera abierta de $\mathbb{R}^3$, con sus componentes C^1 en esta esfera, se tiene que

$$\vec{F} \text{ es conservativo} \iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$

Nota 5.5. Observar que el teorema (5.3) y la nota precedente se pueden enunciar:

$$\vec{F} \text{ es conservativo} \iff \text{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$$

Ejercicio 5.1. Considerar el campo vectorial $\vec{F}(x, y) = (2x \sin y, x^2 \cos y + 2y)$ y C una curva que va del punto $A = (1, -\pi)$ al punto $B = (1, \pi)$. Calcular $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

5.4 Actividades

- 1) a) En el siguiente gráfico se muestra una curva C y las curvas de nivel de un campo escalar f diferenciable con gradiente continuo. Hallar el valor de $\int_C \nabla f \cdot d\vec{r}$.

- b) Idem ejercicio precedente, para las curvas D y E :

- 2) Para el campo vectorial dado $\vec{F}$, encontrar una función f tal que $\nabla f = \vec{F}$ y usar esta función para calcular $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ para la curva dada C .

- a) $\vec{F}(x, y) = (y, x + 2y)$, C es el semicírculo superior que parte en $(0, 1)$ y termina en $(2, 1)$.
- b) $\vec{F}(x, y) = \left(\frac{y^2}{1+x^2}, 2y \arctan x\right)$, $C : r(t) = (t^2, t)$, $0 \leq t \leq 1$.
- c) $\int_C yz dx + xz dy + (xy + 2z) dz$, C el segmento de recta que va del $(1, 0, -2)$ al punto $(4, 6, 3)$.

- 3) Establecer si las siguientes integrales de línea son o no independientes de la trayectoria. Evaluar la integral propuesta.

- a) $\int_C \tan y dx + x \sec^2 y dy$, C es una curva que va del origen al punto $(1, 1)$.
- b) $\int_C (1 - ye^{-x}) dx + e^x dy$, C es una curva que va del $(-1, 1)$ al punto $(1, 1)$.

- c) $\int_C ydx + xdy + xyzdz$, C el segmento de recta que va del origen al punto $(1, 1, 1)$.
- 4) Sea $\vec{F} = \nabla f$, donde $f(x, y) = \sin(x - 2y)$. Determinar curvas *no cerradas* C_1 y C_2 de modo que:
- a) $\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ b) $\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 1$

- 5) Determinar, en caso que exista, un valor del parámetro k de modo que el campo vectorial

$$\vec{F}(x, y) = (kx - y, y - 2k)$$

sea conservativo.

Respuesta. $k = 0.5$

- 6) Para el campo vectorial $\vec{F}(x, y) = \frac{-y\hat{i} + x\hat{j}}{x^2 + y^2}$:

a) Comprobar que $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

- b) Sean C_1 y C_2 las semi circunferencias superior e inferior de la circunferencia con centro en el origen y radio 1, respectivamente. Calcular $\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ y $\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$. ¿Qué se puede concluir?.

- c) La conclusión precedente, ¿contradice el teorema 5.3?.

- 7) Como se comentó en el ejercicio (6) de las actividades (1.4), el campo gravitacional viene dado por:

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{x}) = -\frac{mMG}{\|\vec{x}\|^3} \vec{x}$$

Verificar que el trabajo realizado por este campo vectorial al mover una partícula desde el punto $(4, 0, 0)$ al punto $(0, 0, 2)$ es igual a $\frac{1}{4}mMG$.

Hint. Verificar que $f(x, y, z) = \frac{mMG}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ es una función potencial de $\vec{F}$.

5.5 Desafío

Sea $\vec{F}$ un campo de fuerza de la forma

$$\vec{F}(\vec{r}) = \frac{k\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3}$$

para alguna constante k y con $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$.

Calcular el trabajo realizado al mover un objeto desde un punto P_1 hasta un punto P_2 a través de un camino suave, en término de las distancias d_1 y d_2 de estos puntos al origen.

Hint. ¿Qué es $f(\vec{r}) = \frac{k}{\|\vec{r}\|}$ de $\vec{F}$?